Gel for dry skin and cutaneous rashes
Gel für trockene Haut und Hautausschläge
Gel pour peau sèche et éruptions cutanées
Gel per pelle secca e rash cutanei

StrataCTX®

[EN] Consumer Information

A full contact flexible wound dressing for the management of dry skin and cutaneous rashes.

StrataCTX is a semi-occlusive, self-drying and non-sticky gel. StrataCTX may be directly applied to dry skin, open wounds and compromised or desquamating skin surfaces, including cutaneous rashes. StrataCTX gel is bacteriostatic and inert. StrataCTX contains no steroids, alcohol, parabens or fragrances. StrataCTX is transparent allowing users to monitor therapy progress without removal of the dressing. When used as directed StrataCTX dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and superficial wounds from chemical and microbial invasion.

How StrataCTX works

StrataCTX dries to form a thin, flexible wound dressing which hydrates and protects affected areas. StrataCTX promotes a moist healing environment for wounds or compromised skin. This moist wound healing environment promotes faster re-epithelialisation and significantly reduces the skin's acute inflammatory response. StrataCTX lightly bonds to the most superficial damaged skin layer. StrataCTX is ideal for large surface areas and contoured skin like head, face, hand and foot, as well as joints and hairy areas without the need for shaving.

Intended use

StrataCTX is used to relieve low grade inflammatory changes such as dry, itching, flaking, peeling and irritated skin. For more severe inflammatory changes, StrataCTX reduces pain, redness and heat sensation. StrataCTX was developed for use on all types of wounds, toxic and compromised skin including:

- Cutaneous reactions
- Pruritic, itchy skin
- Xerotic, dry skin
- Desquamation
- Fissures of skin and nail folds
- Blisters
- Medical Adhesive-Related Skin Injuries (MARSI)
- Erythema
- Infusion reactions
- Rashes, including: Maculopapular rash, hand-foot syndrome, GVHD, acneiform reaction, peri– and appendageal (hair follicles, sweat glands)

StrataCTX can be used with or without a secondary protective dressing. StrataCTX is suitable for children and people with sensitive skin. StrataCTX is intended for single patient use.

Directions for use


On first use of 10 g and 20 g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use.


On 50 g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

Ensure that the affected superficial area is clean and dry. Apply a very thin layer of StrataCTX directly to the affected area and allow the gel to dry. When applied correctly to exposed areas, StrataCTX should be dry in 5–6 minutes. If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue. Once dry, StrataCTX may be covered by sunscreen, cosmetics and clothing. StrataCTX should be applied at least twice daily to affected areas, as needed or as advised by your physician. For best results StrataCTX should be maintained in continuous contact with the skin (24 hours a day/7 days a week).

Recommended duration of treatment

StrataCTX is recommended as treatment following the first signs or symptoms on the skin and should be applied until resolved (24 hours a day/7 days a week) or until no further improvement is seen.

How much StrataCTX do I need?

StrataCTX gel is an advanced formulation that requires substantially less product per application than typical creams or gels. A little bit goes a long way.

- **StrataCTX 10 g (0.35 oz)** is enough to treat an area of 36×15 cm (14×6 inch) twice per day for over 5 days.
- **StrataCTX 20 g (0.70 oz)** is enough to treat an area of 36×15 cm (14×6 inch) twice per day for over 10 days.
- **StrataCTX 50 g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 36×15 cm (14×6 inch) twice per day for over 25 days.

Caution

- For external use only.
- StrataCTX should not be placed in contact with the eyes.
- StrataCTX should not be applied over topical medications unless advised by your physician.
- StrataCTX may stain clothing if not completely dry. If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your cutaneous reaction show signs of infection or failure to heal, immediately consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.
- StrataCTX does not require special disposal methods. Please follow your local disposal regulations.
- Within the European Union, serious incidents related to the use of StrataCTX should be reported to Stratpharma and the respective competent authority in the country the user is established.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

[DE] Verbraucherinformation

Flexible Wundauflage mit vollflächigem Kontakt zur Haut für das Management trockener Haut und Hautausschlägen.

StrataCTX ist ein semi-okklusives, selbst trocknendes und nicht klebendes Gel. StrataCTX kann auf trockene Haut, offene Wunden, geschwächte oder desquamative Hautflächen, inklusive Hautausschlägen aufgetragen werden. StrataCTX Gel ist bakteriostatisch und inert. StrataCTX enthält keine Steroide, Alkohol, Duftzusätze oder Para-bene. StrataCTX ist transparent. Der Verwender kann somit den Therapiefortschritt überwachen, ohne die Wundauflage entfernen zu müssen. Bei ordnungsgemäßer Anwendung bildet StrataCTX nach dem Trocknen eine Schutzschicht, die sowohl gasdurchlässig als auch wasserundurchlässig ist. So werden beeinträchtigte Hautstellen und offene Wunden mit Feuchtigkeit versorgt und vor chemischen und mikrobiologischen Verunreinigungen geschützt.

Wie StrataCTX wirkt

StrataCTX trocknet zu einer dünnen, flexiblen Wundauflage welche die betroffenen Hautstellen hydriert und schützt. StrataCTX begünstigt eine feuchte Wundheilungsumgebung für Wunden und geschwächte Haut. Diese feuchte Wundheilungsumgebung fördert eine schnellere Epithelneubildung und reduziert die akute Entzündungsreaktion der Haut. StrataCTX bindet sich leicht an die geschädigte Hautoberfläche. StrataCTX eignet sich ideal für große und unebene Hautoberflächen wie Kopf, Gesicht, Hände und Füße, sowie für Gelenke und behaarte Hautstellen, ohne diese vorher rasieren zu müssen.

Anwendungszweck

StrataCTX wird angewendet um leichte Entzündungsreaktionen wie Trockenheit, Juckreiz, Abschuppung, Hautabschälungen und gereizte Haut zu lindern. Bei stärkeren Entzündungsreaktionen reduziert StrataCTX Schmerz, Rötungen und Hitzeempfindung. StrataCTX wurde für den Gebrauch für alle Arten von Wunden und geschwächter Haut entwickelt:

- Hautreaktionen
- Pruriginöse Haut
- Xerotische, trockene Haut
- Desquamation
- Nagelfalz- und Hautfaltenfissuren
- Blasen
- Durch medizinische Klebstoffe bedingte Hautverletzungen
- Erythem
- Infusionreaktionen
- Ausschläge inkl.: Makulopapulöser Hautausschlag, Hand-Fuß-Syndrom, GVHD, akneiforme Reaktionen, Hautanhangsgebilde inkl. Umgebung (Haarfollikel, Schweißdrüsen)

StrataCTX kann mit oder ohne sekundärem Schutzverband verwendet werden. StrataCTX ist für die Anwendung bei Kindern und Personen mit empfindlicher Haut geeignet. StrataCTX ist für eine Einpatientenbehandlung bestimmt.

Anwendungshinweise


Bei der ersten Anwendung der 10 g- und 20 g-Tube Verschluss entfernen und Tubenspitze abschneiden. Nach Gebrauch wieder verschließen.


Bei der 50 g-Tube Verschluss entfernen und Schutzfolie abziehen. Nach Gebrauch wieder verschließen.

Es muss sichergestellt werden, dass die betroffene Hautstelle sauber und trocken ist. StrataCTX sehr dünn auf die betroffene Hautstelle auftragen und das Gel trocknen lassen. Bei ordnungsgemäßer Anwendung auf den betroffenen Stellen sollte StrataCTX innerhalb von 5–6 Minuten getrocknet sein. Sollte die Trockenzeit überschritten werden, wurde ggf. zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Gazestück abtupfen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen. Nach dem Trocknen können auf StrataCTX Sonnencremes oder Kosmetika aufgetragen, sowie Kleidung angezogen werden. StrataCTX sollte mindestens zweimal täglich, nach Bedarf oder wie von Ihrem Arzt verordnet auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn StrataCTX dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist (24h/Tag, 7 Tage/Woche).

Empfohlene Anwendungsdauer

StrataCTX wird als Behandlung nach dem Auftreten erster Symptome empfohlen.

Die Anwendung sollte bis zur vollständigen Heilung fortgesetzt werden (24h/Tag, 7 Tage/Woche), oder bis keine weitere Verbesserung mehr sichtbar ist.

Empfohlene Packungsgröβe

StrataCTX Gel ist eine hochentwickelte Formulierung, die wesentlich weniger Produkt pro Anwendung benötigt als typische Cremes oder Gele.

- **StrataCTX 10 g** ist ausreichend, um eine Fläche von 36×15 cm weimal täglich fur die Dauer von 5 Tagen zu behandeln.
- **StrataCTX 20 g** ist ausreichend, um eine Fläche von 36×15 cm weimal täglich für die Dauer von 10 Tagen zu behandeln.
- **StrataCTX 50 g** ist ausreichend, um eine Fläche von 36×15 cm zweimal täglich für die Dauer von 25 Tagen zu behandeln.

Warnhinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- StrataCTX sollte nicht mit den Augen in Kontakt gebracht werden.
- StrataCTX darf nicht ohne vorherige ärztliche Rücksprache auf andere Mittel zur Hautbehandlung aufgetragen werden.
- Wenn StrataCTX noch nicht vollständig getrocknet ist, kann es Flecken auf der Kleidung verursachen. Im Falle einer Verunreinigung entfernt eine chemische Reinigung die Flecken ohne den Stoff zu beschädigen.
- Für eine korrekte Aufbewahrung die Tube fest mit der Verschlusskappe verschließen.
- Sollte Ihre Wunde Infektionszeichen aufweisen oder nicht heilen, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Sollten Hautreizungen auftreten, brechen Sie die Behandlung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Nicht geeignet bei stark exsudierenden und tunnelförmigen Wunden oder Verbrennungen dritten Grades.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach dem auf der Tube angegebenen Verfallsdatum (EXP) nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum ändert sich nach dem Öffnen der Tube nicht.
- Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist.
- StrataCTX erfordert keine speziellen Entsorgungsmethoden. Bitte halten Sie sich an Ihre örtlichen Entsorgungsvorschriften.
- Innerhalb der Europäischen Union sollten schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung von StrataCTX an Stratpharma und die jeweils zuständige Behörde des Landes, in dem der Anwender ansässig ist, gemeldet werden.

STERIL WENN UNGEÖFFNET

Wirkstoffe: Polydimethylsiloxane, Siloxane, Alkylmethylsilikone

[FR] Informations consommateurs

Un pansement filmogène souple pour le soin des peaux sèches et des éruptions cutanées.

StrataCTX est un gel semi-occlusif, à séchage automatique et non collant. Il peut être appliqué directement sur peau sèche, peau, notamment parties abîmées ou desquamation de la peau notamment les éruptions cutanées. StrataCTX est bactériostatique et inerte. StrataCTX ne contient pas de stéroïdes, d'alcool, de parabènes ou de parfum. StrataCTX est transparent, permettant aux utilisateurs de suivre la progression du traitement sans retirer le pansement. Si les consignes d'utilisation sont scrupuleusement suivies, StrataCTX forme, après séchage, une couche protectrice qui est à la fois imperméable à l'eau et perméable au gaz. Cette pellicule protège et hydrate les parties abîmées de la peau et les plaies superficielles.

Mode d'action de StrataCTX

En séchant, StrataCTX forme un fin pansement souple qui protège et hydrate les zones compromises de la peau. StrataCTX produit un environnement humide facilitant la cicatrisation de plaies et peaux endommagées. Un environnement humide est idéal pour promouvoir une ré-épithélialisation rapide de la peau. De plus, il permet de réduire les signes aigus d'inflammation. StrataCTX n'adhère que légèrement à la couche superficielle de l'épiderme endommagé. StrataCTX est idéal pour de larges surfaces, ainsi que les extrémités et zones sensibles telles que la tête, le visage, les mains, les pieds, plis et zones pileuses, sans nécessiter d'épilation.

Mode d'administration

StrataCTX est utilisé pour soulager les signes in-

flammatoires cutanés légers comme sècheresses, démangeaisons, irritations, éruptions cutanées, et/ou les pelades. Pour des signes inflammatoires plus graves, StrataCTX soulage la douleur, réduit les rougeurs et sensations de chaleur. StrataCTX est conçu pour être utilisé sur tout type de plaies et lésions de la peau comme:

- Réactions cutanées
- Peau prurigineuse (démangeaisons)
- Peau sèche et xérotique
- Desquamation
- Fissures de la peau et plis des ongles
- Ampoules
- Lésions cutanées liées à l'adhésif médical
- Erythèmes
- Réactions à la perfusion
- Eruptions cutanées: Eruption maculopapuleuse, Syndrome palmoplantaire, RGCH, Réaction acnéiforme, Glandes sudoripares et apocrines (follicules pileux, transpiration)

StrataCTX peut être utilisé avec ou sans pansement secondaire. StrataCTX convient aux enfants, ainsi qu'aux personnes à peau sensible. Chaque tube de StrataCTX est à usage individuel.

Mode d'emploi


A la première utilisation d'un tube de 10 g et 20 g, dévisser le bouchon, couper l'embout du tube. Refermer le tube après chaque utilisation.


Lors de la première utilisation d'un tube de 50 g, dévisser le bouchon et retirer l'opercule protecteur. Refermer le tube après chaque utilisation.

Avant toute application, s'assurer que la plaie ou la zone à traiter est propre et sèche. Appliquer une fine couche de StrataCTX sur la zone concernée et laisser sécher. Si correctement appliqué, StrataCTX sèche en 5 à 6 minutes. Dans le cas contraire, trop de produit a été appliqué : retirer le surplus à l'aide d'un linge propre ou d'une compresse, et laisser sècher. Une fois que le gel est sec, StrataCTX peut être recouvert de crème solaire, de produits cosmétiques et vêtements. StrataCTX devrait être utilisé au moins 2 fois par jour. La dose doit être adaptée selon vos besoins ou suivant la prescription du médecin. Pour de meilleurs résultats, StrataCTX doit être maintenu en contact permanent avec la peau (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).

Durée de traitement recommandée

Il est préférable d'utiliser StratCTX dès l'apparition des symptômes sur la peau et de l'appliquer jusqu'à leur disparition (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'amélioration visible.

De combien de StrataCTX ai-je besoin ?

Le gel StrataCTX est une formule unique permettant d'appliquer moins de produit par rapport à une crème ou une pommade traditionnelle pour une même surface traitée.

- **StrataCTX 10 g** suffit pour traiter une surface de 36×15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 5 jours.
- **StrataCTX 20 g** suffit pour traiter une surface de 36×15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 10 jours.
- **StrataCTX 50 g** suffit pour traiter une surface de 36×15 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 25 jours.

Mise en garde

- Usage externe uniquement.
- StrataCTX ne doit pas être en contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser StrataCTX sur d'autres traitements topiques, sans un avis médical préalable.
- En cas de séchage incomplet, StrataCTX est susceptible de tâcher les vêtements. Dans ce cas un nettoyage à sec permettra de la retirer sans endommager les vêtements.
- Pour une meilleure conservation, bien refermer le tube après utilisation.
- Si les réactions cutanées semblent s'infecter ou ne guérissent pas, veuillez consulter un médecin immédiatement.
- En cas de démangeaisons, interrompre le traitement et consulter votre médecin traitant.
- Ne convient pas pour les plaies très exsudatives, béantes ou les brûlures du 3ème degré.
- A conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) qui figure sur le tube. Une fois le tube ouvert, la date d'expiration (EXP) ne change pas.
- Ne pas utiliser si le tube est endommagé.
- StrataCTX ne nécessite pas de gestion des déchets spécifique. Veuillez suivre vos réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Au sein de l'Union Européenne, les incidents graves liés à l'utilisation de StrataCTX doivent être signalés à Stratpharma et à l'autorité compétente du pays où l'utilisateur est établi.

STÉRILE JUSQU'À OUVERTURE

Ingrédients : Polydiméthylsiloxane, siloxane, silicones alkylméthyles

[IT] Informazioni per il consumatore

Una medicazione di contatto flessibile usata per la gestione di pelle secca e rash cutanei.

StrataCTX è un semiocclusivo, autoasciugante e gel non appiccicoso. StrataCTX può essere direttamente applicato su pelle secca, ferite aperte e superfici cutanee compromesse e desquamate, incluso rash cutanei. StrataCTX gel è batteriostatico ed inerte. StrataCTX non contiene steroidi, alcol, parabeni o fragranze. StrataCTX è trasparente, permettendo al paziente di monitorare il progresso della terapia senza la rimozione del rivestimento protettivo. Se utilizzato come indicato, StrataCTX si asciuga in modo da formare uno strato di protezione che è permeabile ai gas e impermeabile all'acqua e che idrata e protegge le aree epidermiche compromesse e le ferite superficiali da invasioni chimiche e microbiche.

Come funziona StrataCTX

StrataCTX si asciuga in modo da formare uno strato di protezione sottile, flessibile che idrata e protegge le aree danneggiate. StrataCTX promueve un ambiente húmedo para la cicatrización de heridas o piel comprometido. L'ambiente umido per la guarigione della ferita favorisce una riepitelizzazione più veloce e riduce significativamente la risposta infiammatoria acuta della pelle. StrataCTX aderisce delicatamente allo strato piú superficiale della pelle danneggiata. StrataCTX è ideale per aree superficiali estese e per la pelle sagomata, come testa, viso, mani e piedi, così come per articolazioni e aree pilifere senza bisogno di rasatura.

Uso previsto

StrataCTX è usato per alleviare stati infiammatori lievi, come pelle secca, pruriginosa, desquamata, spellata e irritata. Per stati infiammatori più severi, StrataCTX riduce dolore, rossore, sensazione di calore ed aiuta a lenire le aree esposte della pelle. StrataCTX è stato sviluppato per l'uso su tutti i tipi di ferite e pelle compromessa, incluso:

- Reazioni cutanee
- Pelle pruriginosa ed urticante
- Pelle secca e xerotica
- Desquamazione
- Ragadi della pelle o attorno alle unghie
- Vesciche
- Lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali
- Eritema
- Reazioni all'infusione
- Rash cutanei, incluso: Esantema maculo papulare, Sindrome mano-piede, Malattia del trapianto contro l'ospite, Eruzione acneiforme, Annessi cutanei (follicoli piliferi, ghiandole sebacee)

StrataCTX può essere usato con o senza un rivestimento protettivo secondario. StrataCTX è adatto a bambini e a persone con pelle sensibile. StrataCTX è pensato per l'utilizzo da parte di un solo paziente.

Istruzioni per l'uso


Al primo utilizzo del tubetto da 10 g e 20 g rimuovere il tappo, tagliare la punta del tubetto e richiudere coan il tappo dopo l'uso.


Nel tubetto da 50 g rimuovere il tappo, poi il sigillo di protezione e richiudere con il tappo dopo l'uso.

Assicurarsi che l'area superficiale interessata sia pulita ed asciutta. Applicare uno strato molto sottile di StrataCTX direttamente sull'area interessata e permettere al gel di asciugare. Se applicato correttamente, StrataCTX dovrebbe asciugare in 5–6 minuti. Se impiega più tempo ad asciugare, ne è stata probabilmente applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente la quantità in eccesso con un fazzoletto pulito o una garza e lasciar continuare il processo di asciugatura. Una volta asciutto, StrataCTX può essere coperto da creme solari, cosmetici o indumenti. StrataCTX deve essere applicato almeno due volte al giorno sulle aree interessate, a seconda del bisogno o come indicato dal medico. Per migliori risultati StrataCTX dovrebbe essere mantenuto in continuo contatto con la pelle (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana).

Durata raccomandata del trattamento

StrataCTX è raccomandato come trattamento a seguito dei primi segni o sintomi sulla pelle e deve essere applicato fino alla risoluzione dei medesimi (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana) o fino a che non si riscontra alcun ulteriore miglioramento.

Quanto StrataCTX va applicato?

StrataCTX gel è una formulazione avanzata che richiede meno prodotto per applicazione rispetto a normali creme o gel.

- **StrataCTX 10 g** è sufficiente per trattare un'area di 36×15 cm due volte al giorno per oltre 5 giorni.
- **StrataCTX 20 g** è sufficiente per trattare un'area di 36×15 cm due volte al giorno per oltre 10 giorni.
- **StrataCTX 50 g** è sufficiente per trattare un'area di 36×15 cm due volte al giorno per oltre 25 giorni.

Avvertenze

- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto di StrataCTX con gli occhi.
- StrataCTX non dovrebbe essere applicato su altri trattamenti topici senza il parere del medico.
- StrataCTX può macchiare gli abiti se non completamente asciutto. In caso di macchia, il lavaggio a secco dovrebbe essere in grado di rimuoverla senza danneggiare il tessuto.
- Per una corretta conservazione richiudere bene il tubetto con il tappo.
- Nel caso in cui la sua reazione cutanea mostrasse segni di infezione o non riuscisse a guarire, immediatamente consultare il medico.
- In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Non adatto a ferite altamente essudative o sottocutanee o ad ustioni di terzo grado.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scandenza (EXP) indicata sulla confezione. La data di scadenza (EXP) non cambia una volta che il tubetto è stato aperto.
- Non usare il tubetto se è danneggiato.
- StrataCTX non richiede metodi di smaltimento speciali. Smaltire in conformità alle normative locali.
- All'interno dell'Unione Europea gli incidenti gravi relativi all'uso di StrataCTX devono essere segnalati a Stratpharma e alle Autorità Nazionali Competenti del paese in cui l'utilizzatore è stabilito.

STERILE FINO ALL'APERTURA

Ingredienti: Polidimetilsilossani, Silossani, Alchilmetil Siliconi

Stratpharma Switzerland Heal Better™

www.stratactx.com

MD — Medical device
Medizinprodukt
Dispositifs médicaux
Dispositivo medico

Consult instructions for use
Gebrauchsanweisung beachten
Consultez le mode d'emploi
Consultare le istruzioni per l'uso

Keep out of the reach of children
Für Kinder unzugänglich aufbewahren
A conserver hors de portée des enfants
Tenere fuori della portata dei bambini

Use by date
Verfallsdatum
Date limite d'utilisation
Data di scadenza

LOT — Batch code
Seriennummer
Numéro de lot
Codice del lotto

Date of manufacture
Herstellungsdatum
Date de fabrication
Data di produzione

STERILE R — Sterilized using irradiation
Durch Bestrahlung sterilisiert
Stérilisé par irradiation
Sterilizzato mediante irradiazione

Single sterile barrier system
Einfaches Sterilbarrieresystem
Système de barrière stérile unique
Sistema a singola barriera sterile

Do not use if the tube is damaged
Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist
Ne pas utiliser si le tube est endommagé
Non utilizzare se il tubetto è danneggiato

Stratpharma AG,
Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel,
Switzerland / Schweiz / Suisse / Svizzera

EU REP — Freyr Regulatory GmbH
Marie-Curie Straße 8, 79539 Lörrach,
Germany / Deutschland / Allemagne / Germania
SRN: DE-AR-000047121

Importer to the European Union:
Stratpharma Limited,
Clifton House, Fitzwilliam Street Lower,
Dublin 2, D02 XT91, Republic of Ireland /
Republik Irland / République d'Irlande /
Repubblica d'Irlanda

UK CA 0086 — **UK Responsible Person:**
Freyr Life Sciences Ltd.,
9 Greyfriars Road, Reading, Berkshire,
England, RG1 1NU, United Kingdom

Sponsor in Australia:
Stratpharma Pty Ltd., 4/6 Pryor Street, Eltham VIC 3095, Australia, Tel: 1800 567 007

Date of preparation of this information / Erstellungsdatum der Information / Date de préparation de cette information / Data di redazione delle informazioni: 11/2025

CE 2797 CT000INT1PI05-1125